

Patientinformation

Opløsning af ikke-permanent filler med hyaluronidase

Hvad er hyaluronidase?

Hyaluronidase (hyalase) er et lægemiddel, der ved injektion kan opløse hyaluronsyre holdige ikke-permanente fillers. Oftest ser man læber, der er overfyldte med skævheder, buler eller at filleren er migreret og ligger i den hvide del af overlæben. Dette skyldes som regel en kombination af for meget og forkert placering af produktet, men kan også opstå efter flere års brug af filler, selv med korrekt produkt og injektionsteknik. Af og til vurderer vi, at det er nødvendigt at opløse et behandlet område for at kunne opnå et ønsket resultat.

Vi behandler også dig, der har problemer med hævelse under øjnene efter filler behandling eller blot er ked af dit look efter filler behandling i fx. hage, kæbe og kindben.

Hyalase virker på alle typer hyaluronsyre holdige fillers og virker ved at accelerere absorptionen af hyaluronsyren i filleren, hvorved den nedbrydes. Nogle gange er det nødvendigt at gentage behandlingen med hyalase.

De fleste vil se en hurtig respons og størstedelen af hyaluronsyren er opløst allerede efter 30 min, dog kan det tage nogen dage før virkningen er aftaget. De fleste vil opleve hurtig effekt. Allerede inden for 4-48 timer. Men for nogen kan det kræve flere behandlinger, før man kan se en synlig forbedring.

Vi anbefaler, at du venter 1 måned med at få filler behandling i området igen.

Før behandlingen

Inden behandling skal du til konsultation hos klinikens kosmetiske sygeplejerske. Behandlingen kan udføres samme dag som konsultationen. Konsultationen er gratis og uforpligtende. Du er velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med og du skal afsætte ca. 30 min til konsultationen. Under konsultationen vil I diskutere dine forventninger og muligheder samt besvare eventuelle spørgsmål eller bekymringer. På behandlingsdagen skal du undgå at plukke hår i det område, hvor behandlingen udføres.

Der vil blive lavet patch test inden behandlingen, hvor vi injicerer en smule hyalase på et lille område på din underarm, og der observeres i 15 min. for en eventuel reaktion.

Før behandlingen tages der billeder af behandlingsområdet. Billederne opbevares sammen med det øvrige journalmateriale fortroligt. Huden skal være intakt så infektioner undgås. Huden skal være helt ren og fri fra make-up. 30 min. Inden behandling bliver huden påført et lag bedøvelsescreme, da behandlingen ikke er smertefri.

Efter behandlingen

- Undgå at røre de behandlede områder i 6 timer og brug ikke makeup samme dag.
- Hvis du tager medicin med acetylsalicylsyre (f.eks. Kodimagnyl, Hjertemagnyl eller Treo), har du større tendens til blå mærker.
- Det anbefales at holde pause med fiskeolie en lille uges tid før og efter behandlingen.
- Hvis du tidligere har haft et forkølelsessår, er der en risiko for, at behandlingen kan fremprovokere et nyt udbrud. Der anbefales tbl. Valaciclovir, som fås på recept hos egen læge.
- Man må ikke have allergi overfor hyalase, hveps og bier og man skal forblive i klinikken i 30 min efter injektionen til observation for allergiske bivirkninger.

Bivirkninger

Umiddelbart efter behandlingen vil huden reagere på indsprøjtningen ved at være let til moderat hævet, rød og øm. Disse reaktioner forsvinder løbende, typisk i løbet af et par dage og i de fleste tilfælde indenfor 1 uge. Læberne hæver ofte mest. Blålig misfarvning kan forekomme.

Dybere blødninger ses sjældent. Der er altid risiko for infektion, når man laver hul i huden. Tiltagende varme, smerter, rødme, hævelse, betændelse, feber som typisk opstår i de første døgn efter behandling bør vurderes af os eller egen læge, og vil blive behandlet med antibiotika. Skulle det ske, at der kommer en infektion, er det ikke klinikken, der afholder udgifterne for antibiotika. Det er vigtigt at følge sygeplejerskens anbefalinger for at minimere risici og opnå de bedste resultater.

I sjældne tilfælde kan der opstå en rødme eller hævelser i huden, specielt under øjet, der kan vare i mdr/år.

Kontraindikationer

Der bør udvises forsigtighed med at behandle hvis:

- Der er infektion ved indstiksstederne
- Allergi overfor Hyaluronidase
- Allergi overfor hvepse og bier
- Ved graviditet og amning
- Blødersygdom/hæmofili

Forventet effekt af behandlingen

Som tidligere nævnt, vil de fleste se en hurtig respons og størstedelen af hyaluronsyren er opløst allerede efter 30 min. Dog kan det tage nogen dage før virkningen er aftaget. De fleste vil opleve hurtig effekt. Allerede inden for 4-48 timer. For nogen kan det kræve flere behandlinger, før man kan se en synlig forbedring. Når en behandling er udført professionelt og korrekt, kan man ikke fortryde sin behandling og dermed bede om refundering af betalingen. Man kan heller ikke bede om kompensation for bivirkninger, som man er blevet oplyst om.

Opstår der noget AKUT, er telefonen altid åben og kan benyttes også uden for arbejdstid på tlf.: 28345288

Revideret Oktober 2025 af speciallæge Kristian Bakke Arvesen, næste revidering: Oktober 2026.
(version 3)